R CrA領域における 超低質量天体の近赤外線観測

金井昂大, 大朝由美子(埼玉大学)

1

Introduction

初期質量関数

星は質量が軽いほど多く形成される

1M_⊙までは増加の傾きがほぼ同じ

低質量側では大きなばらつき

→暗く、観測例が少ない

Offner et al. 2014

3

Introduction

初期質量関数

星は質量が軽いほど多く形成される

4

Introduction

超低質量天体の理論進化モデル

e.g. Baraffe et al. 2015

・低質量星

→中心で水素の核融合が起こり、安定して輝く

・超低質量天体

→水素の核融合が起きず徐々に暗くなってゆく

年齢と共に光度・温度が変化

7

Introduction

超低質量天体探査

我々のグループが若い超低質量天体探査を行ってきた領域(<1kpc)
大質量星形成領域～低質量星形成領域 様々な環境をもつ

銀河面付近におけるCOガスの分布図(Dame et al. 2001)

同じ手法を用いた観測・解析により、
超低質量天体形成の環境依存性/普遍性を探る

11

Introduction

観測領域

可視光のイメージ
Credit: Loke Kun Tan (StarryScapes)

14

Introduction

観測領域

R CrA 領域

→ Herbig Ae/Be 型星

中質量星形成領域

距離

150pc
Gali et al. 2020

X線-電波観測等、様々な波長によるYSO探査

→数十天体のYSOが発見

Spitzer等による低質量YSO探査

(e.g. Perterson et al. 2011)

⇔ 惑星質量天体を目的とした探査は行われていない

16

Introduction

観測領域

R CrA 領域

→ Herbig Ae/Be 型星

中質量星形成領域

- 深い近赤外測光観測で超低質量天体候補を同定
- 近赤外追分光観測で質量/年齢を同定
- 分子雲の物理量と比較

→数十天体のYSOが発見

→ 超低質量天体形成の普遍性を探る

(e.g. Perterson et al. 2011)

⇔ 惑星質量天体を目的とした探査は行われていない

17

Observations

近赤外測光観測

望遠鏡	UKIRT@マウナケア (英国赤外線望遠鏡)
観測装置	WFCAM (広視野赤外線検出器)
観測日(UT)	2010/08/08
観測波長	J(1.25 μ m), H(1.64 μ m), K(2.20 μ m)
観測視野	13.7' $\times$ 13.7' $\times$ 4視野
シーイング	約0.9"
積分時間	800s

20

Observations

近赤外測光観測

• 画像比較

可視画像(DSS)

(0.3 μ m, 0.6 μ m)

遠赤外画像(Herschel)

(150 μ m, 250 μ m, 500 μ m)

近赤外画像(UKIRT)

(1.2 μ m, 1.6 μ m, 2.2 μ m)

21

Discussions

分子雲との比較

ALMA ^{13}CO

Herschelダスト柱密度 (Sicilia-Aguilar+2013)

ALMA ^{13}CO

・TTSなどのアウトフローやネビュラと一致

惑星質量天体候補

…領域の全体に分布

低質量星/褐色矮星候補+先行研究 ($M \geq$ 褐色矮星)

→ 分子雲南側のやや高密度な領域に多く分布

● 低質量星候補
 ● 褐色矮星候補
 ● 惑星質量天体候補
 ● TTS I 候補
 ● 主系列星
 (Sicilia-Aguilar & Luhman 2022)

Discussions

Herschelダスト柱密度との比較

R CrA領域のみ

R CrA領域+低質量星形成領域

△: L1689/1709, ×: Lupus I

惑星質量天体：全体に分布

低質量星/褐色矮星：高密度領域に多く分布

低質量星/褐色矮星形成は分子雲のダスト密度に依存？

→ 今後分子雲のガスの物理量と比較

Discussions

初期質量関数

Off-cloud
参照領域

Class II天体候補のIMF
(参照領域の天体数を差し引き済み)

信頼限界(破線)にかけて
天体数は増加
低質量星で小さなピーク

測光観測の不定性...

- ・背景星/銀河の混入
- ・年齢を仮定した質量導出

追分光観測により

- ・YSOの同定
- ・質量/年齢の導出

38

Observations

近赤外追分光観測

同定したYSO候補38天体を含む、計110天体を観測

望遠鏡	すばる望遠鏡
観測装置	MOIRCS (多天体近赤外分光装置)
観測日(UT)	2020/09/02
グリズム	HK500(1.35-2.2 μ m)
観測視野	4'×7'×2視野
シーイング	約0.3"
積分時間	2100s, 2400s

39

Observations

近赤外追分光観測

- Subaru/MOIRCS 多天体同時(>60obj.)分光観測

40

Results

得られたスペクトルの例

42

Discussions

質量/年齢導出

- 輻射光度(測光観測) + 有効温度(分光観測)を理論進化モデルと比較
→ 質量/年齢をそれぞれ導出

30Myrよりも年齢が大きい天体は背景天体として同定

測光分類	惑星質量天体	褐色矮星	Class I
観測数	17	1	10
解析済	2	1	5
同定数	1	1	4
>30Myr	1	0	1

and more...

43

Issues

現在の課題

OH夜光がH₂Oの吸収量比 測定波長域に重なっている
→いくつかの暗い天体では有効温度の導出が困難

観測条件

- 露出：300s×7-8枚
 - 高度：~35度
 - 薄明中
- OH夜光の変動が大きい

対策

- 夜光が重なっている部分のフラックスを付近の波長域で補完
- スペクトルフィッティングを行なうを検討中

OH夜光の波長に深い吸収 (2400s 積分; 3点ビニング)

45

Summary

まとめ

R CrA領域(~150pc)における若い超低質量天体の探査

- UKIRT/WFCAMによる近赤外測光観測
 - 超低質量天体候補を~400天体同定
 - 同定した天体の質量ーダスト柱密度に相関？

現在進行中…

- すばる望遠鏡/MOIRCSによる近赤外追分光観測
 - 候補天体の質量/年齢を同定
 - 少なくとも1天体の惑星質量天体を初同定

今後…

- ALMA望遠鏡で得られた分子雲環境との比較

47

48